

آمادگی جهت انجام سونوگرافی :

- برای انجام سونوگرافی ناحیه لگن بایستی با مثانه پر مراجعه کنید.
- برای انجام سونوگرافی شکم چنانچه کیسه صفرا مدنظر باشد بایستی حداقل 5 ساعت قبل از سونوگرافی از خوردن غذا خودداری کنید.
- برای انجام سونوگرافی حاملگی چنانچه حاملگی زیر 3 ماه باشد باید با مثانه پر مراجعه کنید .
- برای انجام سونوگرافی شکم و لگن علاوه بر ناشتا بودن بایستی با مثانه پر مراجعه کنید.
- چنانچه هرگونه بیماری پوستی و یا مسری دارید با پزشک خود درمیان بگذارید.
- وجود موهای زائد پوست بدن مانع از سونوگرافی هست و بهتر است تراشیده شود.
- سونوگرافی از روی پوست و با ژل مناسب انجام شود.
- هنگام داشتن زخم باز نمی توان سونوگرافی انجام داد، زیرا ژل سونوگرافی موجب تحریک زخم و یا آلودگی می شود.
- نوشیدن آب و چای و مایعات برای پر شدن مثانه کافی هست. لذا هیچگاه از داروهای ادرار آور خصوصا بدون توصیه پزشک استفاده نکنید.
- برای بررسی سونوگرافی از کلیه ها، مثانه ، رحم، تخمدان و لگن مثانه را با خوردن چند لیوان آب از چند ساعت قبل پر کنید.
- ضرورت پر بودن مثانه دو علت دارد:
- چون مثانه پر مانند یک ذره بین برای بررسی رحم و تخمدان عمل کرده و باعث شفافیت تصویر می شود.
- مثانه پر، گازهای روده را که مزاحم سونوگرافی هستند به بالا رانده و آنها را از صفحه تصویر برداری دور می سازد.

تأیید کننده : دکتر نسرين خانی (متخصص رادیولوژی)

تهیه کننده: الهام عزیزی (سوپروایزر آموزش سلامت)

کرمانشاه-میدان فردوسی-بیمارستان معتضدی 37246352 - 37246693

خط مستقیم آموزش به بیمار: 37264790

داخلی واحد آموزش بیمار: 185

آدرس سایت : www.motazedi.kums.ac.ir