

سالمپنژوگرافي و آمادگي براي بارداري:

- سالمپنژوگرافي (HSG)
 - يك روش تصويربرداري كه براي بررسي بازبودن لوله هاي فالوپ در زناني كه در باردار شدن مشكل دارند انجام مي شود.
 - زمان مناسب جهت انجام سالمپنژوگرافي: بهترين زمان انجام يك هفته بعد از پايان خونريزي قاعدگي است، اين زمان باعث مي شود احتمال خونريزي در طول سالمپنژوگرافي كاهش پيدا كند و ديد بهتري از لوله ها فراهم شود.
 - آمادگي قبل از سالمپنژوگرافي:
 - اطمينان از عدم بارداري: قبل از انجام سالمپنژوگرافي بايد از باردار نبودن مطمئن باشيد.
 - مصرف آنتي بيوتيک: براي جلوگیری از عفونت ممکن است پزشک آنتی بیوتیک تجویز کند.
 - مسکن: مصرف مسکن هایی مثل ایبوپروفن یا ناپروکسن یک ساعت قبل از سالمپنژوگرافي می تواند به کاهش درد کمک کند.
 - مراقبت های بعد از سالمپنژوگرافي:
 - خونريزي: بعد از سالمپنژوگرافي ممکن است خونريزي يا لکه بيني داشته باشيد كه طبيعي است.
 - درد: ممکن است کمی درد يا گرفتگی شکم داشته باشيد كه با مسکن قابل کنترل است.
 - علائم عفونت: در صورت بروز علائم عفونت مثل تب، درد شديد شکم يا ترشحات غيرطبيعي سريعا به پزشک مراجعه کند.
 - افزايش شانس بارداري بعد از هيستروسالمپنژوگرافي:
 - بعضي از مطالعات نشان مي دهد كه شانس بارداري بعد سالمپنژوگرافي افزايش مي يابد. در صورت عدم بارداري بعد از چند ماه با پزشک مشورت كنيد.

تأیید کننده: دکتر نسرین خانی (متخصص سونوگرافي)

تهيه کننده: الهام عزیزی (سوپروایزر آموزش سلامت)

کرمانشاه-میدان فردوسی-بیمارستان معتضدی 37246352-37246351

خط مستقیم آموزش به بیمار: 37264790

داخلی واحد آموزش بیمار: 185

آدرس سایت: www.motazedi.kums.ac.ir