

علل احتمالی

معمولا یک مشکل کروموزومی وجود دارد

تشخیص:

تنها راه برای تشخیص سقط جنین خاموش، توسط متخصص زنان و از طریق سونوگرافی است

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر، پزشک سطح hcg را بررسی میکند . HCG هورمونی است که توسط جفت تولید و در یک بارداری زنده ،تعداد آن هر ۴۸ تا ۷۲ ساعت دو برابر می شود .اگر این هورمون به اندازه کافی افزایش نیافته باشد و سونوگرافی نتواند ضربان قلب جنین را تشخیص دهد، احتمالا پزشک سقط را اعلام خواهد کرد.

علائم

سقط فراموش شده معمولا بدون علامت بوده و به صورت اتفاقی در سونوگرافی تشخیص داده می شود، اما گاهی نشانه مشکوکی که مادران دارند، از بین رفتن علائم بارداری مانند تهوع ، و یار حاملگی و سفت و سنگین شدن پستانها تنها راه برای تشخیص سقط جنین خاموش ،است . این حالتها متفاوت از سقط معمولی است که میتواند باعث بروز علائم زیر میشود.

- خونریزی واژن
- گرفتگی شکم
- درد تخلیه مایع یا بافت
- عدم علائم بارداری

در برخی موارد ممکن است ترشحات قهوه ای رنگ وجود داشته باشد.

سقط

زمانی که بارداری قبل از هفته بیستم حاملگی به هر دلیل خاتمه یابد به آن سقط جنین اطلاق میشود سقط جنین عوامل مختلفی دارد که بسیاری از آنها تحت کنترل مادر نمی باشد

سقط فراموش شده (خاموش)

در سقط فراموش شده یا خاموش جنین مرده و ضربان قلب جنین در سونوگرافی دیده نمی شود . اما علائم سقط جنین مانند خونریزی و درد لگن وجود ندارد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

سقط فراموش شده

تایید کننده: دکتر نسرين منصوری (متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

تهیه کننده: الهام عزیزی (سوپروایزر آموزش سلامت)

تلفن: ۷۲۴۶۳۵۱-۷۲۴۶۶۹۳

خط مستقیم آموزش به بیمار: ۷۲۶۴۷۹۰

واحد آموزش بیمار داخلی 185

منبع: کتاب پرستاری مادر و نوزاد/ سقط و انواع آن

www.motazedi.kums.ac.ir

فروردین 1404

درمان

۱- روند طبیعی سقط جنین

که در بیشتر اوقات خونریزی و گرفتگی سقط خود به خود شروع میشود.

۲ / تسریع سقط با دارو

که به انقباض رحم و خارج کردن بافت بارداری کمک می کند.

۳/انجام کورتاژ

اگر بارداری ۱۲ هفته یا بیشتر است ، امکان دارد سقط جنین سخت تر شود و احت احتصاص داد و حس هایش به احتمال زیاد، پزشک توصیه میکند که کورتاژ انجام دهید پزشک در این روش بافت جنین را از رحم خارج می کند.